

## Enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA

### Enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), de la población general de 15 a 49 años:

- 84.6% de los hombres tenían una vida sexual activa.
- 81.6% de las mujeres reportó estar activa sexualmente.

Lo anterior resulta relevante pues las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se propagan generalmente de una persona a otra durante el coito. Algunas también se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo o el parto. Otras modalidades de transmisión de infecciones son la transfusión de productos sanguíneos y el trasplante de tejidos. Entre las enfermedades causadas por infecciones de transmisión sexual figuran la sífilis, el VIH-SIDA y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

#### *Infecciones de Transmisión Sexual*

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2014 se detectaron:

- 65 casos de sífilis congénita, 33 hombres (50.8%) y 32 mujeres (49.2%).<sup>1</sup>
- 3,814 casos de sífilis adquirida, 2,325 hombres (61%) y 1,489 mujeres (39%).<sup>1</sup>
- 2,087 casos de infección gonocócica genitourinaria, 789 hombres (37.8%) y 1,298 mujeres (62.2%).<sup>1</sup>

En relación con el Virus del Papiloma Humano, en 2011 se reportaron 37,293 nuevos casos, de estos 96.1% fueron mujeres. En este mismo año la tasa de incidencia de casos nuevos de VPH es de 31.1 por cada 100 mil hombres y la femenina es de 58.5 por cada 100 mil mujeres.

- 25 a 44 años fue el grupo de edad con mayor afección de nuevos casos de Virus del Papiloma Humano, a razón de casi 27 mujeres por cada hombre.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Datos del Anuario de Morbilidad 2014.

## Enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA

### Uso del condón

La ENSANUT 2012, muestra que los hombres reportan en todos los grupos de edad mayor uso del condón en comparación con las mujeres, cuestión que evidencia posibles factores de vulnerabilidad en las mujeres debido a cuestiones de inequidad de género:

- 41.4% de los hombres de 15 a 49 años de edad reportan el uso del condón durante su última relación sexual, por sólo 24.5% de las mujeres que lo reportan.
- 15 – 19 años es el grupo de edad que más reporta el uso de condón durante su última relación sexual: 79.1% de los hombres por 47.4% de las mujeres.

### VIH-SIDA

- La principal vía de transmisión del VIH en México es la sexual. El virus afecta principalmente a grupos poblacionales específicos, en particular a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que se dedican al trabajo sexual (especialmente hombres) y personas que usan drogas inyectables. Así, durante el periodo 1983-2012<sup>2</sup>, 32% de los casos en que se conoce el modo de transmisión en los hombres, refieren a relaciones sexuales homosexuales, 22% bisexuales, 41% indica vía heterosexual<sup>3</sup>, 2% por uso de drogas inyectables y 1% por transmisión vertical (madre-hijo). En el caso de las mujeres: 87% de los casos en que se conoce el modo de transmisión, refieren a relaciones sexuales heterosexuales, 6% por transmisión vertical, 6% por transfusión sanguínea y 1% por uso de drogas inyectables.
- En 2014, la incidencia en hombres de casos de SIDA fue de 3.88 y 1.35 para las mujeres<sup>4</sup>. Sin embargo, en años recientes se observa un repunte en el crecimiento de nuevos casos entre las mujeres: la razón hombre-mujer de casos de SIDA diagnosticados en el 2013 y 2014 fue de 4.6 y en 2011 fue de 4.4, mientras que en 1985 era de 10.4 hombres por una mujer, en 1990 de 6.1, en 2000 de 4.8 y en 2005 de 3.7.

<sup>2</sup> Datos 1983-septiembre de 2012, Ver CENSIDA (2012), *El VIH/SIDA en México 2012*.

<sup>3</sup> Considerar que el dato de transmisión vía relaciones sexuales heterosexuales podría estar sobre reportado dado que muchos hombres no se asumen homosexuales aunque tengan sexo con otros hombres.

<sup>4</sup> Anuario de morbilidad, 2014.

## Enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA

El Registro Nacional de Casos de SIDA, con información al 13 de noviembre de 2015, refiere<sup>5</sup>:

- Para el periodo 1983-2015, se han notificado 178,591 casos de SIDA<sup>6</sup>, 82% de hombres y 18% de mujeres.
- En el periodo 1983-2015, 14.8% del total de los casos de SIDA se encuentran en el Distrito Federal. Le siguen el Estado de México (10.5%), Veracruz (8.8%) y Jalisco (7.1%). Además, 10.5% de los casos femeninos de SIDA se encuentran en Veracruz, seguido del Estado de México (10.1%), Distrito Federal (8.8%) y Jalisco (6.8%).
- La tasa de mortalidad del SIDA en 2013 fue de 4.2 por cada cien mil habitantes
- En 2013, la incidencia<sup>7</sup> de casos de SIDA notificados en jóvenes de 15-24 años fue de 6.35 en el caso de los hombres y de 1.27 para las mujeres. Para 2014 estas cifras pasaron a 5.7 y 1.05, respectivamente.
- En el periodo 1983-2015, el grupo de edad de 30-34 años es el grupo de edad con mayor porcentaje de casos notificados de SIDA (19.4%), de estos 84.1% son hombres. En el grupo de edad de 15 a 19 años (que representa 1.9% del total), se encuentra la mayor proporción de casos de mujeres (31.5%).
- 57,362 personas continúan registradas como seropositivas<sup>8</sup>. La proporción de hombres es de 74.5% por 25.5% de mujeres.

### Población indígena

Según el Informe final de la consulta sobre VIH-SIDA y pueblos indígenas en áreas fronterizas, publicado por la CDI:

- 30% de las y los entrevistados identifican con precisión que el VIH/SIDA es una infección de transmisión sexual.
- Poco más del 75% del total de los/las entrevistadas percibe a la mujer como principal portadora del VIH.

<sup>5</sup> CENSIDA, Registro Nacional de Casos de SIDA. Actualización preliminar hasta el 13 de noviembre de 2015.

<sup>6</sup> Personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que han sido diagnosticadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

<sup>7</sup> Se refiere al número de casos diagnosticados y notificados en jóvenes de 15-24 años por sexo, entre la población de 15-24 años según sexo de cada año, por 100,000 habitantes.

<sup>8</sup> Persona infectada con el VIH. La seropositividad no indica que padece SIDA ni predice que se desarrolle la enfermedad.

## Enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA

- 45% de la población entrevistada cree que lavarse la vagina después de la relación sexual protege contra ITS.

### Referencias

- Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CENSIDA, (2012), *El VIH/SIDA en México 2012*, disponible en línea: [http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/VIHSIDA\\_MEX2012.pdf](http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/VIHSIDA_MEX2012.pdf)
- Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CENSIDA (2015), *Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. Actualización preliminar hasta el 13 de noviembre de 2015*, disponible en: [http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN\\_2do\\_trim\\_2015.pdf](http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_2do_trim_2015.pdf)
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, (2011), *Informe Final de la Consulta sobre VIH-SIDA y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas*, disponible en línea: [http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_details&gid=179](http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=179)
- INMUJERES, Sistema de Indicadores de Género, disponible en: <http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php>
- Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. Anuario de Morbilidad 1984-2014. Consulta interactiva. Consultado en <http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html>